

# Informacija za pacijente

## Infiltracije na kralježnici



MEDIZINISCH  
RADIOLOGISCHES  
INSTITUT

### Štovana pacijentice, štovani pacijentu,

Vaš liječnik prijavio Vas je za infiltraciju na kralježnici. Infiltracija se sukladno nalogu Vašeg liječnika na temelju Vaših simptoma i Vaših nalaza provodi do korijena živca, u epiduralni prostor kraljezničkog kanala ili u zglobove na kralježnici.

Cilj infiltracije je da se lokalnim ubrizgavanjem medikamena ublaže Vaši bolovi. Na taj način može se popustiti eventualna zategnutost mišića i postaju lakše ponovno moguće pomoćne mjere, kao što je fizioterapija.

### Postupak infiltracije

Infiltracija se provodi računalnim tomografom (CT). Iгла se pomoću CT može postaviti vrlo precizno. U cilju planiranja infiltracije morat ćete ležati oko 15 minuta. Nakon razgovora s Vama radiolog na temelju CT snimki planira optimalni prilazni put. Koža se preciznom iglom čini neosjetljivom. Iгла se potom uz kontrolu na ekranu ugurava, pri čemu se daje lokalni anestetik. Pravilna pozicija igle i raspodjela aktivne supstancije kontroliraju se kontrastnim sredstvom.

Preko iste igle ubrizgava se malo kortizona i lokalnog anestetika. Lokalna anestezija bi nakon nekoliko minuta trebala izazvati osjetno smanjenje bolova. Kortizon sprječava lokalne upale.

Ovisno o mjestu infiltracije i nalogu liječnika ubrizgava se kortizon koji se otapa u vodi (deksametazon) ili kristalni kortizon (Kenacort®).


Kenacort® je kristalni, dugotrajno djelotvorni kortizon i lijek odobren u Švicarskoj. Kenacort® se često ubrizgava u zglobove ili u sluznu vrećicu i vrlo često i već mnogo godina s uspjehom primjenjuje na kralježnici.

Informiramo Vas da Kenacort® po informaciji proizvođača nije indiciran za epiduralnu infiltraciju na kralježnici. Primjena se vrši izvan područja odobrenja. Ukoliko ne želite epiduralnu primjenu Kenacort®, možemo Vam ubrizgati neki drugi medikament. Postoje alternativni preparati koji pokazuju nešto kraće djelovanje.

Nakon popuštanja lokalne anestezije (nekoliko sati) može se ponovno djelomično osjećati Vaš poznati bol. Djelovanje kortizona nastupa sve više nakon oko 1-3 dana. Rijetko ne dolazi do smanjenja bolova.

### Koje neželjene reakcije mogu nastupiti?

- Zbog lokalne anestezije mogu na nekoliko sati nastupiti poremećaji osjeta (utrnucé) i možda (dijelom znatna) slabost. Stoga nekoliko sati ne smijete voziti auto.
- Rjeđe se može formirati krvni podljev.
- Alergije na korištene medikamente.
- Rijetko su moguće infekcije.
- Teoretski je moguće, ali je rijetko, oštećenje nerva s trajnom uzetošću.
- Kortizon može dovesti do nekoliko dana osjećanja vreline i nerveze.



Prezime:

Ime:

Datum rođenja:

### Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja

	da	ne
Uzimate li razrjeđivače krvi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bolujete li od infekcija?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bolujete li od šećerne bolesti (Diabetes)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bolujete li od alergija?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Da li ste ili biste mogli biti trudni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suglasan/na sam s korištenjem Kenacort® izvan područja odobrenja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum:

Potpis pacijentice/pacijenta:

Radiolog:

